



Colgate®

Mange kan ha økt risiko for karies

– uten å selv være klar over det!

Informér og forklar dem om deres risikoprofil og anbefal Duraphat® som en del av kariesbehandlingen.

PROFESSIONAL
— ORAL HEALTH —

Noen er i en situasjon, som **"automatisk"** setter dem i faresone **for økt kariesrisiko**. Dette gjelder spesielt pasienter, med:

Anna, 61



Munntørrrhet

Nedsatt spyttsekresjon forårsaket av medisiner, sykdom, strålebehandling i hode/hals og/eller som er aldersrelatert

Eva, 35



Høy kariesaktivitet

Nylig karieserfaring og nye karieslesjoner

Michael, 52



Karies Profunda

Karies i pulpa, puss og/eller omfattende rotkaries

Men det finnes en rekke **andre** kariesrisikofaktorer, man også skal være **oppmerksom** på:



Dårlig munnhygiene



Høyt sukkerinntak



Lav eller ingen fluorideksponering



Utsatte rotoverflater (spesielt eldre)



Nedsatt finmotorikk



Fast /avtagbar delprotese



Tenner i frembrudd (barn)



Symptomatisk tannlegebesøk



Søsken/foreldre med aktiv karies (barn)



Sårbare grupper



Manglende compliance




Diabetes

► Ved å vurdere alle risikofaktorer sammen med nåværende kariesstatus kan risikoprofilen fastlegges og formidles til pasienten.

Risikovurdering og diagnostikk av også **tidlige** som mer alvorlige karieslesjoner er **grunnleggende** for valg av behandling.

Som hjelp til en strukturert vurdering av kariesrisiko og planlegging av behandling med høyfluorid har Colgate forberedt en ny praktisk guide til bruk i klinikken.

Guiden er basert på CariesCare Practice Guide, som er basert på det omfattende og evidensbaserende International Caries Classification and Management System (ICCMS).¹



► **Pasienter identifisert med økt kariesrisiko har fordel av ekstra fluorid som en del av deres behandling for effektivt håndtering og for å kontrollere karies.**

Duraphat® medisinske høyfluoridprodukter er klinisk dokumentert til å **øke karieskontroll**^{3-6,8}



Til bruk i klinikken



Til bruk hjemme



22.600 ppm fluorid

**Duraphat® 22,6 mg/ml
dentialsuspensjon**



**Duraphat® 5 mg/g
høyfluorid tannpasta**



5.000 ppm fluorid

**3 pakke Duraphat® 5 mg/g
høyfluorid tannpasta**



Til klinikkbruk

Duraphat® 22,6 mg/ml dentalvæske suspensjon

- Inneholder 22.600 ppm F⁻ (NaF)
- Til alle pasienter med økt kariesrisiko
- Anbefales lokalt eller på hele tannsettet
- Påføres 2-4 x årlig
- Danner kalsiumfluorid på tannoverflaten, som frigjør fluorid over flere måneder



22.600 ppm fluorid



Duraphat® dentalvæske suspensjon

Det er klinisk bevist, at Duraphat® dentalvæske suspensjon gir

↓37%


reduksjon i dmfs⁸

↓43%

reduksjon i DMFS⁸

Enkel og rask påføring

- Påfør et tynt lag på tannoverflatene
- Lys, gul farge som visuell hjelp ved påføring. Lysere etter påføring
- Lakken størkner ved spyttkontakt
- Pasienten bør unngå mekanisk påvirkning, slik som spising av harde matvarer og tannpussing i ca. 4 timer etter behandling





Til hjemmebruk

Duraphat® 5mg/g fluoridtannpasta

- Inneholder 5.000 ppm F⁻ (NaF)
- Til pasienter ≥ 16 år med økt kariesrisiko
- Anbefales 3 x daglig i stedet for vanlig tannpasta
- Det anbefales 2 cm tannpasta ved hver tannpusning



Duraphat® 5mg/g fluoridtannpasta

Det er klinisk bevist, at Duraphat® 5mg/g tannpasta

↑ F⁻

tilfører betydelig mer fluorid til saliva gjennom hele dagen^{2,3}

2x

remineraliserer 2 ganger flere initiale rotkarieslesjoner etter 6 måneders bruk⁴

3x

stanser 3 ganger flere rotkarieslesjoner etter 8 måneders bruk⁵

5x

remineraliserer 5 ganger bedre initial fissurkaries etter 14 dagers bruk⁶

enn en vanlig fluoridtannpasta



Se kort video med kliniske studier

Når du anbefaler:

Anbefal nok tuber til neste kontrollbesøk

- 1 tube varer ca. 30 dager
- 3-pakning sikrer 3 måneders kontinuerlig bruk

Informer førstegangsbrukere om at smaken varierer fra generika, så pasienten kan ta et bevisst valg ved utlevering på apoteket.

76%


av pasienter foretrekker smaken av Duraphat®⁷

Inform og involver dine pasienter med høy kariesrisiko og anbefal Duraphat® høyfluoridbehandling



Pasientinformasjonsfoldere

Ny Colgate guide til risikovurdering og behandling med høyfluorid



Blokk med doseringsveiledning til Duraphat® dentalsuspensjon



Skan og bestill gratis på ColgateProShop

Referanser

1. <https://cariescareinternational.com/> - reviewed Sept 2024 2. Staun Larsen L et al. Eur J Oral Sci. 2023 Jun;131(3) 3. Ekstrand KR et al. Caries Res 2015;49(5):489-498 4. Baysan et al. Caries Res 2001;35:41-46 5. Ekstrand KR et al. Caries Res. 2013;47(5):391-8 6. Schiørmøster JF et al. Am J Dent 2007;20(4):212-216 7. Data on file. Preference survey. Jan 2020 (n=82). Sammenlignet med en generisk 5000ppm fluorid tannpasta. 8. Marinho VCC et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013

Informasjon vedrørende anbefaling

Duraphat (natriumfluorid), dentalvæske, suspensjon 22,6 mg/ml

Indikasjoner: Kariesprofylakse. Reduksjon av sensitivitet ved overfølsomme tenner. **Dosering:** Melketenner: Opptil 0,25-0,3 ml påføres. Blanding av melketenner og permanente tenner: Opptil 0,4 ml påføres. Permanente tenner: Opptil 0,75-1,0 ml påføres. For systematisk kariesprofylakse gjentas behandlingen med 3-6 måneders intervall. Overfølsomme tenner: 2-3 påføringer med få dagers mellomrom. **Administrering:** Påføres av tannlege, etter fjerning av større plakkansamlinger. Pasienten bør ikke pusse tennene eller spise før 4 timer etter avsluttet behandling. Se SPC for prosedyre for påføring.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

• **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ulcerøs gingivitt og stomatitt. • **Forsiktighetsregler:** Påsmøring på hele tannsettet bør ikke foretas på tom mage. Ved bivirkninger kan suspensjonen lett fjernes ved tannpuss og munnskylling. Tuben inneholder latexgummi, som kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. Inneholder smaksstoff av bringebæressens med allergener som kan forårsake allergiske reaksjoner. • **Interaksjoner:** Andre høydoserte fluoridpreparater bør ikke benyttes samme dag som Duraphat. Bruk av fluoridlakk bør utsettes i flere dager etter Duraphatpåføring. Inneholder alkohol, bør tas med i en vurdering. • **Graviditet/Amning:** Bruk under graviditet bør unngås. Effekt på barn som ammes kan ikke utelukkes. • **Bivirkninger:** Svært sjeldne: Stomatitt, ulcerativ gingivitt, brekninger, kvalme og munnødem, hudirritasjon, angioødem, astmaanfall, ikke kjent: overfølsomhet. • **Overdosering/Forgiftning:** Ved fluoriddoser på flere mg pr. kg kroppsvikt kan en akutt, toksisk reaksjon forekomme. Første tegn er kvalme, oppkast og diaré. Senere kan hypokalsemi, enzymhemming, tetani, kramper og kardiovaskulære forstyrrelser oppstå. Ved kronisk inntak av høye doser fluorid oppstår forstyrrelser i emaljedannelsen, skeletal fluorose og risiko for beinfraktur øker.

Pakninger og priser (AUP): 5 x 1,6 ml (sylinderramp.) kr. 292,90. 10 ml (tube) kr. 271,80. **Reseptgruppe: C.** For mer informasjon om dosering, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se Duraphat SPC, godkjent 15.04.2024 **Kontakt informasjon:** Colgate-Palmolive A/S Juli 2024

Duraphat (natriumfluorid), tannpasta 5 mg/g

Indikasjoner: Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne (≥16 år), særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). **Dosering:** Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluor) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Administrering: Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

• **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet for innholdsstoffene. • **Forsiktighetsregler:** Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Høyt fluorinnhold. Et økt antall potensielle fluorkilder kan gi fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluorinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluor, andre legemidler med fluor). Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ved beregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpasta tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Inneholder natriumbenzoat som kan forårsake lokal irritasjon. Inneholder også spearmint smakstilsetning med allergener som kan forårsake allergiske reaksjoner. • **Graviditet/Amning:** Skal ikke brukes ved graviditet og amning, med mindre en grundig nytte-/risikovurdering er utført. • **Bivirkninger:** Sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner, brennende følelse i munnen. • **Overdosering/Forgiftning:** Akutt intoksikasjon: Toksik dose er 5 mg fluor/kg kroppsvikt. Symptomer: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. Kan være dødelig i svært sjeldne tilfeller. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Ved svelging av en betydelig mengde, skal det omgående utføres tarmskylling eller fremtvinges brekninger. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluordose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosen. Ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose blir kun sett ved høy kronisk fluorabsorpsjon (>8 mg/dag). **Pakninger og priser (AUP):** reseptpliktig: 51 g kr. 120,90. 3 x 51 g kr. 309,90. Reseptfri: pris ikke fastsatt. **Reseptgruppe C og F.** For mer informasjon om dosering, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se Duraphat SPC, godkjent 15.04.2024 **Kontakt informasjon:** Colgate-Palmolive A/S Juli 2024

PROFESSIONAL
— ORAL HEALTH —